

MASZ

- nadciśnienie?
- migotanie przedsionków?
 - cukrzycę?
- wysoki cholesterol?



**Jesteś w grupie ryzyka
zachorowania na UDAR!!!**



Boehringer
Ingelheim

TEST ROZPOZNANIA UDARU MASZ UDAR!



MOWA
ZMIENIONA

trudności z mówieniem
lub rozumieniem mowy



ASYMETRIA
TWARZY

np. opadnięty kącik ust



SŁABSZA
RĘKA, NOGA

zdrętwienie, osłabienie
albo paraliż ręki lub nogi



ZABURZENIA
WIDZENIA

nagła utrata wzroku w jednym oku,
dwojenie obrazów lub połowicy
ubytek w polu widzenia

UDAR!



DZWOŃ
NATYCHMIAST



AMBULANS



RATUNEK
W SZPITALU
Z ODDZIAŁEM UDAROWYM



Udar jest coraz częstszą przyczyną
niepełnosprawności lub zgonu.

**NIGDY NIE LEKCEWAŹ NIEPOKOJĄCYCH SYMPTOMÓW!
SZYBKE ROZPOZNANIE = SZANSA NA SKUTECZNE LECZENIE
I UNIKNIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!**



CZAS jest najważniejszy!
Leczenie TRZEBA podjąć w ciągu 4,5 GODZ.
od wystąpienia pierwszych objawów!